Antares - ein Neutrinoexperiment im Mittelmeer

Jürgen Brunner

Was sind Neutrinos ? (*)
Neutrinoastronomie – erste Schritte (*)
Das Rätsel der kosmischen Strahlen (*)
Wie funktionieren Neutrino teleskope ?
Aktuelle Projekte → Antares

(*) Thanks for material from Ch. Spiering

Was sind Neutrinos

?

Das Postulat des Neutrinos: Pauli, 1930

Wolfgang Pauli, 1930

Scheinbare Verletzung der
Energieerhaltung beim Betazerfall

Das Postulat des Neutrinos: Pauli, 1930

Wolfgang Pauli, 1930

Das Postulat des Neutrinos: Pauli, 1930

Wolfgang Pauli, 1930

1956: Die Entdeckung des Neutrinos

Cowan und Reines

Nobelpreis 1995

Neutrinostrahlen an Beschleunigern

Nobelpreis 1988

Neutrinos in (Super)Kamiokande

Neutrinos aus der Sonne

Temperatur im Sonnenkern ~ 15 Mio K

Photon-Weg bis zur Sonnenoberfläche:
einige Millionen Jahre

Neutrinos: 2 Sekunden

Bild der Sonne in Neutrinos

***Blauer Kreis:
Sonne im sichtbaren Licht***

Supernova 1987A in der Großen Magellanschen Wolke

Neutrino-Signal von SN-1987A in Kamiokande

Neutrinos von SN 1987A weltweit

- 24 Neutrinos von 3 Experimenten detektiert
- Weitest entfernte Neutrinos, die jemals nachgewiesen wurden

SN 1987A einige Jahre später

Nobelpreis 2002

.. für Öffnung des Neutrino-Fensters
zum Universum

Raymond Davis jr.

Masatoshi Koshiba

Erwartetes Energiespektrum der Neutrinos

Elektromagnetische Wellen: Bilder des Universums

Radio

3-Kelvin Strahlung

Röntgen-Strahlen

γ -Strahlen

Sichtbares Licht

Neutrino Himmelskarte ?

Radio Telescope
(Bonn)

Optical Telescope
(Palomar)

X - ray Satellite
(INTEGRAL/ESA)

Neutrino Telescope

View of sky in Galactic Coordinates in four different photon wavelengths

Radio

Visible light

X - rays

Neutrinos

Die Entdeckung der kosmischen Strahlung

Nobelpreis 1936

Sommer 1912

Spektrum der kosmischen Strahlen

Nichtthermisches Spektrum

Kann durch
Stoßwellenbeschleunigung
erklärt werden

Hypothesen für Quellen
existieren
Direkter Nachweis bisher nicht
gelingen

Deutlich höhere Energien als
am LHC können erreicht
werden

Stoßwellenbeschleunigung ?

- Bei jedem Rückprall erhält der Ball etwas von der Bewegungsenergie der Wände
- Ball → Elektronen, Protonen
- Wand1: z.B. Explosionswolke einer Supernova
- Wand2: umgebendes Material
- Wände: Magnetfelder

Geladene kosmische Strahlung vs. Gamma-Strahlen und Neutrinos

Geladene Teilchen

Extrem hochenergetische geladene Teilchen fliegen fast geradeaus

Geladene Teilchen bei 10^{17} eV

Extrem hochenergetische geladene Teilchen fliegen fast geradeaus

Geladene Teilchen bei 10^{20} eV

Supernovae: Stosswellen in interstellares Medium

bis 10^{16} eV

Supernova vom Jahr 1054

Krebs-Nebel

Aktive Galaxien: Akkretionsscheiben und Jets

bis 10^{20} eV

Radiobild von Cygnus A

Teilchenbeschleunigung in Jets

Ch. Spiering

Protonbeschleunigung:
Protons (CR), Gammas
Neutrinos

Nur Neutrinos können zweifelsfrei
Protonbeschleuniger nachweisen

Electronbeschleunigung:
Gammas + X-rays

Existierende Neutrino-Teleskop-Projekte

Komplementarität Nord-Süd

IceCube (Südpol)

ANTARES (43° Nord)

Eis → Kein optisches Rauschen, steril, sensitiv auch auf niederenergetische Neutrinos

Wasser → Weniger Lichtstreuung → bessere Winkelauflösung

Komplementärer Himmelsausschnitt, wenn nur Signale "von unten" betrachtet werden

ANTARES

- 1996-2002
Detektorentwicklung und
Messung der Tiefseeparameter
- 2002-2008
Konstruktion
- 2006-2013...
Datennahme

ANTARES Kollaboration & Detektorstandort

23 Institutes from
7 European countries

Der ANTARES Standort & Infrastruktur

Die Antares-Etage

Konstruktion von ANTARES

2001: Verlegung des Tiefseekabels

2002: Wasserung der Verteilerbox

Erste komplette Detektorlinie (2006)

Installation einer Detektorlinie mit der CASTOR

Verbindung der ersten Detektorlinie mit ferngesteuertem U-Boot von IFREMER

Verbindung am Linienfuß

ROV VICTOR

Verteilerbox heute

12 + 1 Linie erfolgreich verkabelt
Photo vom U-Boot Mai 2008

Akustisches Positionierungssystem

Laufzeit der akustischen Signale (pings) zwischen festen Sendern am Seeboden und Empfängern auf den Linien erlauben Triangulation und Bestimmung der Positionen

Position der Empfänger (Hydrophone) relativ zum Linienfuß

Implosion eines Photomultipliers

- Etwa ~10 Fälle identifiziert
- Wassereintrich am Kabeleintritt verantwortlich
- Implosion einer Druckglaskugel nie vorgekommen

Erstes Neutrino März 2007

Erwartete Muonraten im Detektor

2008: Neutrinoernte

Kosmische Neutrinos ?

- Bisher nichts gefunden
- Himmelskarte kompatibel mit gleichmäßig verteilten atmosphärischen Neutrinos
- Neutrinoflussgrenzwerte für ausgesuchte Quellen

5-Linien Himmelskarte

94 hochenergetische Neutrino-kandidaten

Declination

Erwartete Himmelskarte für 2007+2008

750 Neutrino-kandidaten

Analyse noch nicht beendet

Akustischer Neutrinonachweis

Winkelverteilung von Tiefseegeräuschen

- Richtungsbestimmung von einer einzelnen Etage
- Alle Signalarten benutzt
- Ein Monat Daten

Dominante Quellen:
Fährlinien nach Korsika
Antares Positionierungssystem

Optisches Rauschen der Photomultiplier

Biolumineszente Tiefseeorganismen

“10. Juni 2004

What will Antares find ? Neutrinos or fish ?
Sheldon Glashow”

Installation von 2 Kameras + Infrarotquellen

Selbstausslöser im Falle eines Biolumineszenzblitzes
Infrarotquelle wird angeschaltet nach Selbstausslöser,
PMT ebenfalls ausgelesen

Installation 2007

Etage 1

Kamera

PMT

Seeströmungsmesser

Etage 5

Kamera

PMT

Kontinuierliche Datennahme

- Mehr als 500 Tage aktive Beobachtungszeit
- ~250 Biolumineszenz Photos/Filme aufgezeichnet
- Verschiedene Signaltypen leicht zu unterscheiden
- Noch keine systematische Auswertung durch Meeresbiologen erfolgt
- Tiefste online-Kameras der Welt !

Antwort an Sheldon Glashow

Antares findet Neutrinos UND Fische
..... aber mehr Neutrinos

ANTARES NIMMT DATEN